

Состав и форма выпуска

Суппозитории для вагинального применения.

В составе имеются: натриевая соль гиалуроновой кислоты 5 мг, масляный экстракт центеллы азиатской, масляный экстракт календулы, масляный экстракт алоэ вера, эфирное масло чайного дерева, полусинтетические глицериды, ВНТ.

Фармакологическое действие

Суппозитории вагинальные Цикатридина действуют благодаря присутствию гиалуроновой кислоты, мукополисахаридов, который присутствует в больших количествах во многих тканях организма. Гиалуроновая кислота функционирует как структурная поддержка, и таким образом придает ткани тонус, питание и эластичность. Многочисленные клинические исследования доказали способность гиалуроновой кислоты ускорять и улучшать процесс эпителизации и восстановления тканей.

Показания к применению

Для усиления восстановительных процессов в участках атрофических и дистрофических изменений слизистой оболочки влагалища. Способствует восстановлению после родов, в гинекологической хирургии, в случаях дистрофии в результате химиотерапии, ионизирующего излучения, сухости влагалища, сухости влагалища из-за дефицита эстрогена.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

Способ применения и дозы

Откройте суппозиторий, потянув за две предварительно разрезанные части блистера, вставьте суппозиторий глубоко во влагалище. Соблюдайте правила гигиены: мойте руки до и после использования медицинского изделия.

Используйте один суппозиторий вечером или по назначению врача. Длительность применения зависит от развития симптомов; при необходимости суппозитории вагинальные Цикатридина можно использовать в течение длительного периода.

Беременность и кормление грудью

Безопасность использования суппозиториев вагинальных Цикатридина во время беременности и кормления грудью не исследовалась. При таких обстоятельствах рекомендуется обратиться к Вашему врачу.

Влияние на способность управлять автомобилем и использовать оборудование или механизмы

Особые меры предосторожности не предусмотрены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими средствами не исследовалась, поэтому перед использованием суппозиториев вагинальных Цикатридина вместе с другими медицинскими изделиями или лекарственными средствами для вагинального применения проконсультируйтесь у врача.

Побочные эффекты

Использование изделий для местного применения, особенно если оно длительное, может вызвать сенсibilизацию. Если это случается, прекратите лечение и обратитесь к врачу, для прохождения соответствующей терапии. В случае возникновения побочных эффектов, не описанных в этой открытке к упаковке, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Условия хранения

Хранить препарат следует в защищенном от света месте, при температуре от 4°C до 25°C.

Условия продажи

Без рецепта.